



## Vaccin contre le VPH

### Virus du papillome humain

#### Le vaccin contre le VPH fait partie du Programme yukonnais de vaccination.

Le virus du papillome humain est une infection très courante au Canada. Sans vaccination, 75 % des gens contracteront une infection au VPH au cours de leur vie. Le virus se propage surtout lors de relations sexuelles où il y a contact peau à peau. Il peut parfois mener à de graves complications, comme le cancer et la mort. Les vaccins contre le VPH sont sûrs et constituent également la meilleure façon d'éviter l'infection. Discutez du vaccin, pour vous ou votre enfant, avec votre prestataire de soins.

#### Symptômes du VPH

- Verrues génitales
- Cancer du col de l'utérus
- Cancers de la tête et du cou
- Cancers de l'anus, du pénis, du vagin et de la vulve

#### Complications possibles

- Cancers invasifs
- La mort

#### Pourquoi recommande-t-on le vaccin?

Le fait de recevoir le vaccin contre le VPH à un jeune âge prévient les infections avant même d'être à risque. Trois personnes actives sexuellement sur quatre contracteront le VPH dans leur vie.

La plupart des personnes infectées sont asymptomatiques et peuvent transmettre le virus sans le savoir. Parfois, le VPH se résorbe, mais il peut causer un cancer, directement ou indirectement.

Le vaccin VPH-9 protège contre neuf types de VPH. Il prévient notamment le cancer du col, du vagin, de la vulve, du pénis, de l'anus et de la gorge, ainsi que l'apparition de verrues génitales. Le vaccin procure une protection sûre, efficace et durable.

#### Effets secondaires du vaccin

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaisse au point d'injection. Certaines personnes peuvent avoir de la fièvre ou des maux de tête ou éprouver de la fatigue ou des troubles digestifs. Ces réactions sont généralement légères et ne durent qu'un jour ou deux.

Les effets secondaires sont faciles à soulager, par exemple en appliquant une compresse d'eau froide. Au besoin, prenez un analgésique comme l'acétaminophène. En cas de symptômes graves ou durant plus de 48 heures, consultez votre prestataire de soins.

Vous devez rester à la clinique 15 minutes après la vaccination dans l'éventualité d'une réaction allergique grave et extrêmement rare (moins d'un cas sur un million) qui se traite sur place. Si une réaction se déclare après votre départ, appelez le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.

[yukonimmunization.ca/fr](http://yukonimmunization.ca/fr)