

ÊTES-VOUS EN ÉTAT DE CONDUIRE?

CONNAISSEZ LES RISQUES

Les antidépresseurs les plus utilisés aujourd'hui ont moins d'effets secondaires et d'interactions médicamenteuses qu'avant. Mais des interactions avec d'autres médicaments sont toujours possibles.

TOUJOURS UN MAUVAIS MÉLANGE

Consommer des antidépresseurs et de l'alcool en même temps peut affecter votre jugement, votre coordination, vos habiletés motrices et votre temps de réaction au volant. Ce mélange peut sérieusement nuire à votre capacité à conduire ou à effectuer d'autres tâches qui requièrent de la concentration et de l'attention.



Antidépresseurs et médicaments contre l'anxiété

Voici une partie de cette grande classe de médicaments sur ordonnance :

- Benzodiazépines (Alprazolam, Clonazépam et Lorazépam)
- Citalopram (Celexa)
- Escitalopram (Lexapro)
- Fluoxétine (Prozac, Sarafem,

Selfemra, Prozac hebdomadaire)

- Fluvoxamine (Luvox)
- Paroxétine (Paxil, Paxil CR, Pexeva)
- Sertraline (Zoloft)
- Vortioxétine (Trintellix, anciennement Brintellix)
- Vilazodone (Viibryd)

Effets secondaires courants :

- Fatigue et somnolence
- Vision brouillée
- Difficulté à se concentrer
- Maux de tête et étourdissements

CONNAISSEZ LES MÉDICAMENTS
QUI AFFAIBLISSENT LES FACULTÉS.
CONSULTEZ VOTRE PHARMACIEN
OU VOTRE MÉDECIN.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web.
Yukon.ca/medicaments-affaiblissant-les-facultes

