

Après avoir reçu un vaccin à ARNm contre la COVID-19 (PERSONNES DE 5 ANS ET PLUS)

Une fois vacciné, **attendez au moins 15 minutes avant de quitter le centre de vaccination.**
On pourrait vous demander de patienter 30 minutes en cas de risque de réaction allergique.

Effets secondaires courants

Les effets secondaires suivantes peuvent se manifester jusqu'à 2 jours après l'administration du vaccin :



Douleur, rougeur, démangeaison ou enflure*



Fatigue ou maux de tête



Douleurs musculaires ou articulaires



Enflure ou douleur au niveau des aisselles*



Fièvre ou frissons



Nausée ou vomissements

En cas d'effets secondaires

Douleur du bras : appliquez une serviette fraîche et humide ou de la glace enveloppée d'un linge.
Douleur ou fièvre : prenez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène. Consultez un professionnel de la santé si vous avez besoin de conseils au sujet des médicaments que vous pouvez prendre.

Situations rares après la vaccination

De rares cas d'inflammations cardiaques ont été signalés après l'administration de vaccins à ARNm. Signes et symptômes à surveiller dans les 7 jours suivant la vaccination :

- Douleurs thoraciques
- Essoufflement
- Sensation de pouls fort ou rapide, ou de palpitations qui ne disparaît pas au repos ou qui est accompagnée d'autres symptômes
- Notez que ces cas rares n'ont pas été observés dans les essais cliniques de Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans.

Symptômes à surveiller

- Bien que rares, des effets secondaires graves ou une forte réaction allergique (éruption cutanée, enflure du visage, de la langue ou de la gorge, difficultés respiratoires) peuvent survenir. Le cas échéant, consultez un médecin ou appelez le 911 immédiatement.
- Certains des effets secondaires du vaccin ressemblent aux symptômes de la COVID-19, d'autres non. L'écoulement nasal, le mal de gorge et la toux ne sont pas des effets secondaires dus au vaccin. Il ne faut donc pas supposer que tous les symptômes y sont liés.
- Si vous avez reçu le vaccin et que vous avez des symptômes de la COVID-19, et si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, vous devez vous isoler et passer un test de dépistage dans les plus brefs délais. Faites l'auto-évaluation en ligne au yukon.ca ou appelez le 811.

* Ces symptômes peuvent apparaître immédiatement ou dans un délai d'une semaine, voire plus.

Délai entre les doses

2^e dose :

- Vaccin de Pfizer (Comirnaty) pour les 5 à 17 ans : 8 semaines après la 1^{re} dose
- Vaccin de Moderna (Spikevax) pour 18 ans et plus : 8 semaines après la 1^{re} dose

3^e dose (12 ans et plus) :

- Seulement pour les personnes modérément ou gravement immunovulnérables, 4 semaines après la 2^e dose

Dose de rappel (pas pour les 5 à 17 ans) – Vérifiez l'admissibilité au yukon.ca/fr/voila-notre-chance :

- Au moins 6 mois après la première série vaccinale

1^{re} série
vaccinale

Pour participer à la surveillance de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19, visitez le canvas-covid.ca/fr/.
Pour en savoir plus, visitez le yukon.ca/fr/vaccin-contre-covid-19.